

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.

LIDOCAINA E NIFEDIPINA GEL

Formulazione

Nifedipina	0,3 g
Lidocaina HCl	1,5 g
Glicerolo	13 g
Polisorbato 20	7 g
Nipagina	0,08 g
Nipasolo	0,02 g
Carbossimetilcellulosa	6 g
Acqua altamente depurata	q.b. a 50 g

Preparazione

A) Dosare l'acqua e riscaldarla, quindi solubilizzare i due preservanti e la lidocaina HCl.

B) A parte sospendere la nifedipina in polisorbato 20 ed aggiungervi il glicerolo.

Unire A e B e disperdere a pioggia la carbossimetilcellulosa, agitando lentamente fino alla formazione del gel.

Indicazioni terapeutiche

Gel anestetico.

Regime di dispensazione

Ricetta non ripetibile.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

