

ERITROMICINA CREMA-GEL 3%

Formulazione

Eritromicina	3%
Glicole propilenico	10%
Alcool etilico 96°	10%
Olio vaselina leggero	5%
Sepigel	4%
Butilidrossitoluolo (BHT)	0,02%
Acqua altamente depurata	q.b. a 100%

Preparazione

Sciogliere l'eritromicina ed il BHT in alcool etilico, aggiungere l'acqua e pian piano il Sepigel, agitando lentamente per non inglobare aria e garantire omogeneità.

Infine aggiungere il glicole propilenico e l'olio di vaselina leggero.

Indicazioni terapeutiche

Antibiotico con azione batteriostatica e battericida, indicato per infezioni superficiali della pelle e per il trattamento dell'acne.

Bibliografia

Formulario basico de medicamentos magistrales (M.J. Llopis, V. Baixauli).

Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

Note

Lavare la zona interessata con acqua e sapone ed asciugare prima dell'applicazione della crema.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

